



# PIREDOWN®

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

**Formulación:** Solución Oleosa

**Ingrediente Activo:** Extracto de piretrinas naturales I y II (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) (al 20%) Equivalente a 13.37 g de piretrinas naturales I y II/L

**Presentación:** Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.

**Registro COFEPRIS:** EN TRAMITE

### 1. Generalidades

**PIREDOWN** es un insecticida agrícola de origen botánico, que actúa sobre la plaga y en los cultivos mencionados en el cuadro de recomendaciones.

### 2. Composición Porcentual

Ingrediente Activo:	% Peso
Extracto de piretrinas naturales I y II ( <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ) ..... 7.00 con una pureza del 20% de piretrinas I y II (equivalente a 13.37 g de piretrinas I y II/L a 20°C)	7.00
<b>Ingredientes Inertes</b>	
Diluyente y emulsificante .....	93.00
<b>TOTAL:</b> .....	<b>100.00</b>

### 3. Tabla de dosis

Cultivo	Intervalo de Seguridad	Plaga	Dosis L / ha	Observaciones
Jitomate Chile Chile Bell Berenjena Tomate de cáscara Papa Tabaco	Sin Límite	MOSCA BLANCA Bemisia tabaci	1 - 3 lt.	Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 días Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros individuos

**Tiempo de reentrada a la zona tratada:** cuando seque el producto  
**Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

## 4. Métodos para preparar y aplicar el producto

Agite el envase antes de usar. Abra el envase de **PIREDOWN** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello. Añada un poco de agua al tanque de la aspersora, aparte hacer una pre-mezcla con la cantidad a usar de **PIREDOWN** remueva (nunca con las manos) hasta lograr una buena emulsión. Después llene el tanque con agua mientras continua agitando hasta lograr una emulsión homogénea. Mantenga agitando mientras realiza la aplicación. Para conseguir un control efectivo, se debe lograr una buena cobertura de los cultivos tratados. Se recomienda calibre su equipo de aplicación dependiendo la etapa fenológica del cultivo.

## 5. Contraindicaciones

Aplicar en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 Km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes, a favor del viento. **PIREDOWN**, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

## 6. Compatibilidad

No definida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. Aplicar el producto por la tarde para evitar horas de máxima irradiación solar. Es compatible con soluciones neutras y ligeramente básicas. No mezclar con soluciones ácidas.

## 7. Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

*IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.*