



HORMOMAX[®]

REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 1

Formulación: Suspensión Acuosa

Ingrediente Activo: Materia orgánica, Ácido giberélico, Ácido indol acético, Ácido indol butírico

Presentación: Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.

Registro COFEPRIS: RSCO-171/IX/18

1. Generalidades

HORMOMAX es un complejo de hormonas vegetales y materia orgánica. La ausencia de estas provoca en la planta falta de crecimiento e ineficiencias ante el estrés ocasionado por factores climáticos. El uso de este producto favorece la floración y el amarre del fruto, mejora la calidad y firmeza de la fruta. Para optimizar el producto se recomienda que no se someta a temperaturas extremas y mantener cerrado el recipiente para evitar pérdidas por evaporación y que pueda descomponerse el producto.

2. Composición Garantizada

Ingrediente Activo:	% Peso
Materia orgánica	9.74
Ácido giberélico [(3s,3As,4s,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metileno-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b, 3-propenoazuleno[1,2-b]furano-4-ácido carboxílico]	0.12
Ácido indol acético [ácido 1H-indol-3-acético]	0.20
Ácido indol butírico [ácido 3 indol butírico]	0.11

3. Tabla de dosis

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 2 horas después de la aplicación.
Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Cultivo	Intervalo de Seguridad	Dosis L / ha	# De Aplicaciones y Época de Aplicación
Jitomate Chile Chile Bell Berenjena Tomate de cáscara Papa Tabaco	SL	0.75 y 1.0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones foliares. La primera durante el inicio de la floración, la segunda durante al amarre de fruto y la última durante el desarrollo y el engorde de frutos.

4. Métodos para preparar y aplicar el producto

Agítese antes de usar. Es un producto de aplicación foliar. Calibrar su equipo antes de realizar la aplicación. Siempre use el equipo de protección descrito en la sección "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". En aspersiones terrestres se recomienda utilizar de 200 a 400 litros de agua/ha, en aspersiones aéreas, de 50 a 100 litros de agua/ha. Para mejor rendimiento deberá aplicarse evitando altas temperaturas y días con lluvia o con demasiada humedad.

Con el equipo de seguridad puesto abra el envase de **HORMOMAX** debe de abrirse en el lugar de aplicación, retire la tapa e inviértala, colóquela sobre el sello de seguridad y gírela sobre él para abrir con la cejilla de ayuda. Para medir la cantidad necesaria de **HORMOMAX**, use un utensilio sólo para este fin. Vierta en el tanque o equipo de aplicación con la mitad de volumen recomendado de agua, agite y complete el volumen necesario.

5. Contraindicaciones

Aplicar en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 Km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes, a favor del viento. **HORMOMAX**, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

6. Compatibilidad

No definida. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad. Aplicar el producto por la tarde para evitar horas de máxima irradiación solar. Es compatible con soluciones neutras y ligeramente básicas. No mezclar con soluciones ácidas.

7. Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.

IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.